

EL PLAGUERO AL DIA



ESTOS GUSANOS ME VAN A DEJAR EL CAÑAL SIN CEPAS ¡QUE VAINA!



TECNICAS DE COMO DESTRUIR ESTA PLAGA

¡COMBATA LOS JOBOTOS!

(*Phyllophaga* spp.)



UNA MAÑANA NUESTRO AMIGO CHEPE PLATICABA CON SU VECINO SOBRE PROBLEMAS DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZUCAR

MIRA AMIGO, TENGO UN PROBLEMA CON UNOS GUSANOS BLANCOS QUE SE ESTAN COMIENDO LAS RAICES DE LA CAÑA Y EN ESTA ZAFRA EL RENDIMIENTO FUE MUY MALO



BUENO, CHEPE,,, YO TENIA EL MISMO PROBLEMA Y FUI A BUSCAR A LOS TECNICOS DEL CULTIVO.



ELLOS ESTUVIERON EN LA FINCA Y ME RECOMENDARON COMO CONTROLAR ESTOS GUSANOS CONOCIDOS COMO JOBOTOS

LOS JOBOTOS SE COMEN LAS RAICES DE LA CAÑA, LA PLANTA NO PUEDE ABSORBER LOS NUTRIENTES Y EL AGUA QUE NECESITA, POR LO QUE NO CRECE BIEN Y SE PONE AMARILLA.



ASI QUE LOS JOBOTOS SON UNA PLAGA DEL SUELO



HUEVO

NACIMIENTO Y CRECIMIENTO DEL JOBOTO



PUPA TRANSFORMANDOSE



ABEJON

EL CICLO DE VIDA DEL INSECTO PASA POR CUATRO ESTADIOS: EL HUEVO DEL CUAL NACE EL JOBOTO, ESTE SE CONVIRTE EN PUPA Y DE ESTA SALE EL ADULTO QUE ES UN ABEJON, LOS CUALES CONOCEMOS COMO ABEJONES DE MAYO.

CUANDO INICIA LA TEMPORADA DE LLUVIAS, LOS ABEJONES SALEN DEL SUELO A BUSCAR PAREJA DE NOCHE.

LA HEMBRA PONE SUS HUEVOS CERCA DE LA CEPA Y A LOS DIAS APARECEN LOS PRIMEROS GUSANOS



ESTOS GUSANOS PASAN ENTRE UNO Y HASTA DOS AÑOS EN EL SUELO CRECIENDO.

.. CLARO, DESTRUYENDO LOS CAÑALES SE DAN LA GRAN VIDA



LA CUCARACHA LA CUCARACHA!

¡ CARAMBA...! ¿Y CÓMO LOS COMBATIMOS?

EL PRIMER CONSEJO ES NO DEJAR QUE ESOS ABEJONES PONGAN SUS HUEVOS






SE HACE UN HUECO EN EL CAÑAL DE 35 CM. DE PROFUNDIDAD Y DE UNOS 40 CM DE ANCHO POR 70 DE LARGO

DESPUES SE RECUBRE CON PLASTICO, SE LE ECHA AGUA CON JABÓN Y EN EL CENTRO SE COLOCA UNA CANFINERA





TAMBIEN SE PUEDE USAR UN ESTAÑÓN PARTIDO POR LA MITAD O SINO UTILIZAR LA TRAMPA QUE RECOMIENDAN LOS TECNICOS, QUE FUNCIONA CON UNA BATERIA O CON LUZ ELECTRICA.



TAMBIEN SE PUEDEN
USAR INSECTICIDAS LIQUIDOS
ATOMIZADOS EN LOS ARBOLES
DE MALINCHE Y GUACIMO DE
DONDE SE ALIMENTAN
ESTOS ABEJONES DURANTE
LA NOCHE, CUANDO LA
CANTIDAD ES ALTA.



RECUERDA QUE SE DEBE
UTILIZAR GUANTES, MASCARA
PROTECTORA Y EQUIPO ADECUADO
PARA REALIZAR ESTA PRACTICA.

CUANDO SE VA A RENOVAR, UNA BUENA ARADA
Y RASTREADA, HACE QUE MUCHOS JOBOTOS QUEDEN
EXPUESTOS AL SOL O A QUE SE LOS COMAN
LOS ZANATES, LAS GARZAS Y OTRAS AVES.



CON LA CAÑA EN CICLO SOCA SE PUEDE
SUBSOLAR, DESAPORCAR Y APORCAR
OBTENIENDO UN EFECTO SIMILAR.

