



ACTUALIDAD CAÑERA

La temporada de abejones demanda su captura masiva para prevenir problemas de jobotos (*Phyllophaga spp.*) en caña de azúcar


Ing. Kevin Núñez Chacón

La presencia estacional de abejones en las zonas cañeras constituye una señal importante para reforzar las labores de vigilancia y manejo preventivo en el cultivo. Durante este periodo, los productores pueden implementar prácticas orientadas a disminuir el impacto futuro de plagas del suelo, especialmente aquellas que afectan el desarrollo radicular y el vigor de las plantas.

En este contexto, el uso de herramientas de monitoreo y control oportuno permite fortalecer las estrategias de manejo integrado, favoreciendo una producción más sostenible y reduciendo riesgos asociados a pérdidas en campo. La participación activa de los productores en estas acciones resulta clave para mejorar la protección y productividad del cultivo de caña de azúcar.

Por esta razón, se recomienda a los productores mantenerse atentos al inicio de la temporada y aplicar oportunamente las medidas de manejo recomendadas, con el fin de contribuir a la reducción de poblaciones y a la protección del cultivo.

La captura de abejones como estrategia para el manejo de jobotos (*Phyllophaga* spp.) en caña de azúcar



Ing. Kevin Núñez Chacón



Con la llegada de las primeras lluvias, los adultos de abejones de mayo (*Phyllophaga* spp.) emergen masivamente del suelo tras completar su desarrollo larval, dando inicio a su fase reproductiva.

En el Manejo Integrado de Plagas, la captura masiva de abejones (*Phyllophaga* spp.) con feromonas reduce la reproducción de adultos y la oviposición en el suelo. Esto disminuye la población de jobotos (larvas), responsables del daño radicular en caña de azúcar y las pérdidas asociadas en campo.

Actualmente, se pueden adquirir las siguientes feromonas



P. menetriesi

Feromona **P523-Lure**



Región

Valle Central
Sur
Turrialba



P. elenans

Feromona **P049-Lure**



Región

Guanacaste
Pacífico Central



P. vicina

Feromona **P051-Lure**



Región

Valle Central
Sur
Turrialba
Norte
Pacífico Central



knunez@laica.co.cr
rconejo@laica.co.cr
roviedo@laica.co.cr



La sincronización de la emergencia con las lluvias define una ventana crítica de manejo, donde las feromonas permiten la captura masiva de adultos y la reducción de poblaciones.



Próximos *Eventos*



Capacitación para el reconocimiento y monitoreo de la Roya Naranja (*Puccinia kuehnii*)

Hora: 8:00 a.m.

Lugar: Sala de sesiones de la Cámara de
Cañeros Zona Sur, San Isidro de El General,
Pérez Zeledón

19
MAYO

Esta capacitación está orientada al reconocimiento de los síntomas de la Roya Naranja (*Puccinia kuehnii*) en caña de azúcar y a la estimación del área foliar afectada, con el fin de fortalecer las labores de monitoreo y manejo de la enfermedad en campo. Para más información, puede comunicarse con Erick Chavarría Soto, encargado del Área de Fitopatología, al correo echavarria@laica.co.cr



Próximos *Eventos*



Diagnóstico y manejo recomendado de plagas en el cultivo de caña de azúcar

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Sala de Reuniones, Ingenio Quebrada Azul, San Carlos.

La charla abordará el diagnóstico e identificación de las principales plagas en caña de azúcar, así como las recomendaciones de manejo para su prevención y control oportuno en campo. Para más información, puede comunicarse con Allan Ruíz Solano, coordinador de Región Norte, al correo aruiz@laica.co.cr



Diagnóstico y manejo recomendado de plagas en el cultivo de caña de azúcar

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Restaurante La Quinta frente a Ingenio Cutris, San Carlos.

La charla abordará el diagnóstico e identificación de las principales plagas en caña de azúcar, así como las recomendaciones de manejo para su prevención y control oportuno en campo. Para más información, puede comunicarse con Allan Ruíz Solano, coordinador de Región Norte, al correo aruiz@laica.co.cr